

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

Laboratorio 1

Primavera 2019

Sumas de Riemann. Integral de Riemann. Propiedades de la integral definida.

1. Escribe $\frac{2}{1} - \frac{4}{3} + \frac{6}{5} - \frac{8}{7} + \frac{10}{9}$ en la notación $\sum_{k=1}^n a_k$.

2. En cada inciso indica si la afirmación es verdadera o falsa:

(a) $\sum_{k=1}^{100} k + 2 = \sum_{k=1}^{100} k + \sum_{k=1}^{100} 2$.

(b) $\sum_{i=0}^{99} (i+1)^2 = \sum_{i=3}^{102} (i-2)^2$.

(c) $\frac{\sum_{k=1}^{100} k}{\sum_{k=1}^{100} k^2} = \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k}$.

(d) $\sum_{i=0}^{100} 2 = 200$.

3. Expresa el límite como una integral definida (no calcules la integral):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} \left[\left(2 + \frac{4(1)}{n} \right)^{1/2} + \left(2 + \frac{4(2)}{n} \right)^{1/2} + \dots + \left(2 + \frac{4(n)}{n} \right)^{1/2} \right].$$

4. Evalúa la integral $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ como el límite de una suma de Riemann. Sugerencia: usa la partición de $[0, 1]$ en donde

$$x_k = c_k = \frac{k^2}{n^2}$$

y, correspondientemente,

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = \frac{k^2}{n^2} - \frac{(k-1)^2}{n^2} = \frac{2k-1}{n^2}.$$

5. En cada inciso argumenta si en el intervalo dado la función es: (i) continua, (ii) acotada, (iii) integrable:

(a) $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [-1, 0) \\ 5, & x = 0 \\ -2, & x \in (0, 1] \end{cases}$ en $[-1, 1]$.

$$(b) f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen } x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad \text{en } [-10\pi, 10\pi].$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{en } [0, 1].$$

6. Calcula $\int_{-1}^1 |2x + 1| dx$.

7. Determina $\int_{-2}^a |x| dx$. Analiza los casos $a \leq 0$ y $a > 0$.

8. Prueba que $\frac{x^6}{\sqrt{2}} \leq \frac{x^6}{\sqrt{1+x^2}} \leq x^6$, si $x \in [0, 1]$. Concluye que

$$\frac{1}{7\sqrt{2}} \leq \int_0^1 \frac{x^6}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \frac{1}{7}.$$

9. Demuestra que si f es integrable en $[a, b]$, entonces

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

Sugerencia: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$.

10. Decide si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, y en caso de ser falsas proporciona un contraejemplo:

(a) Si $\int_a^b f(x) dx \geq 0$, entonces $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$.

(b) Si $f(x) \geq 0$ y $\int_a^b f(x) dx = 0$, entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$.

(c) Si f y g son continuas y $f(x) > g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\left| \int_a^b f(x) dx \right| > \left| \int_a^b g(x) dx \right|$.

(d) Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_a^b g(x) dx \right).$$