

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II

Laboratorio 6

Primavera 2020

Funciones trigonométricas inversas

1. Prueba que

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{|x|}\right) = \operatorname{sen}^{-1}\left(\sqrt{1-x^2}\right), \quad \text{si } 0 < |x| \leq 1.$$

Sugerencia: Dibuja un triángulo o deriva ambos lados de la igualdad.

2. Considera la función definida por $f(x) = -\pi + \cos^{-1}(1 - \ln x)$.

- Determina: (i) el dominio de f , (ii) la imagen de f , (iii) los ceros de f , (iv) las soluciones de la ecuación $f(x) = -\pi$.
- Demuestra que f es inyectiva.
- Caracteriza la función inversa de f (dominio, imagen y regla de correspondencia).
- Esboza la gráfica de f .

3. (a) Prueba que

$$\int \operatorname{sech}(x) dx = \tan^{-1}(\operatorname{senh}(x)) + C.$$

Sugerencia: $\int \operatorname{sech}(x) dx = \int \frac{1}{\cosh(x)} dx = \int \frac{\cosh(x)}{\cosh^2(x)} dx.$

(b) Prueba también que

$$\int \operatorname{sech}(x) dx = \operatorname{sen}^{-1}(\operatorname{tanh}(x)) + C. \quad (\text{Derivar.})$$

4. Sea

$$f(x) = \int_0^{1/x} \frac{1}{t^2+1} dt + \int_0^x \frac{1}{t^2+1} dt, \quad \text{con } x > 0.$$

- Sin resolver la integral, demuestra que f es constante.
- Resolviendo la integral, demuestra que la constante es $\pi/2$.
Sugerencia: $\cot^{-1}(x) = \tan^{-1}(1/x)$.

5. Halla el dominio de cada función y luego encuentra su derivada:

- $f(x) = \sec^{-1}(\ln x)$.
- $f(x) = 3 \operatorname{sen}^{-1}(\sqrt{x^2-1})$.

6. Simplifica la expresión $\sec(\sin^{-1}\sqrt{x})$.
7. Determina la primitiva de la función $f(x) = \sec(x)$, efectuando el cambio de variable $t = \sin(x)$. (Sugerencia: Integra usando la sustitución indicada y luego utiliza el ejercicio 7 del laboratorio 5.)
8. Encuentra las siguientes integrales definidas:

(a) $\int_1^e \frac{dx}{x(1 + \ln^2 x)}$.

(b) $\int_{-2}^{2\sqrt{3}-2} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8}$.

(c) $\int_{-b}^{-b/2} \frac{dx}{\sqrt{-2bx - x^2}}$, $b > 0$.