INTRODUCCIÓN A LAS MATEMATICAS SUPERIORES

TEMA 6

FUNCIONES LOGARÍTMICAS

Una función exponencial de base a tiene la forma $f(x) = a^x$ para toda $x \in R$ donde $a > 0$ y $a \neq 1$. Si la base es e se llama exponencial natural tiene la forma $f(x) = e^x$.

L1.- ¿Con la información que cuenta de las funciones exponenciales puede determinar si existe la inversa de una función de ese tipo? Si ésta existe ¿Por qué?, indicar su dominio e imagen.

L2.- Determinar a qué función exponencial corresponde cada una de las gráficas y dibujar su inversa.

En cada caso indicar el dominio y la imagen de la inversa, dónde es positiva, dónde negativa y a qué valor tiende cuando $x \rightarrow \infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$.

A la inversa de la función $f(x) = a^x$, se le llama logaritmo de base a y se denota por $f(x) = \log_a x$.

La función $y = \log_a x$.

Def. **Logaritmos base a** Para toda $a > 0$, $a \neq 1$, $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$. Esto es, el valor de la función logaritmo base a corresponde al exponente al que hay que elevar la base para obtener el valor de x .

Si la base del logaritmo es e se llama **logaritmo natural** y se representa como $\ln(x)$, si la base del logaritmo es 10 se llama **logaritmo común** y se denota como $\log x$.

L3.- Determinar el valor de

- a) $\log_2(16)$ b) $\log(100)$ c) $\log(0.01)$ d) $\log_2(2)$
 e) $\log_2(1) \ln(e)$ f) $\ln(1/e)$ g) $\ln(\sqrt{e})$ h) $\ln(1)$

L4.- A partir de la gráfica que se presenta a continuación realizar las operaciones gráficas que se solicitan en los incisos a) a c) y proporcionar la regla de correspondencia de la función que representa la gráfica original y cada una de las obtenidas en los incisos.

- a) desplazar la gráfica de la función una unidad verticalmente hacia arriba,
 b) desplazar la gráfica de la función obtenida en el inciso anterior, 2 unidades hacia la derecha,
 c) reflejar con respecto al eje x la gráfica obtenida en b).

L5.- Graficar las funciones que se presentan a continuación e indicar el dominio y la imagen de cada una de ellas:

- a) $y = \log_2 x$ b) $y = \log x$ c) $y = \log_3(-x)$
 d) $y = \ln x$ e) $y = \log_2(x+3)$ f) $y = -3\log_3 x$
 g) $y = 3 + \log_{10} x$ h) $y = 4\log_2(x+1) - 3$ i) $y = -2 + \ln x$
 j) $y = 7 + \log_2(x-5)$ k) $h(x) = |\ln(x-2)|$ l) $h(x) = \ln|x-2|$
 m) $f(x) = \begin{cases} \log(-x) & \text{si } x \leq -1 \\ \ln(x-1) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ n) $y = \ln\sqrt{x}$

L6.- Indicar la sucesión de operaciones gráficas utilizadas para transformar la gráfica de $f(x)$ en la de $g(x)$ y expresar analíticamente ambas funciones.

a)

b)

- L7.- a) Proporcionar la regla de correspondencia de la función que aparece graficada abajo.
 b) Dibujar, determinar el dominio, el rango y regla de correspondencia de su **función recíproca**.

- c) Dibujar, determinar el dominio, el rango y regla de correspondencia de su **función inversa**.

L8.- Determinar el valor al que tiende $y = \ln(8x + 2)$ si

- a) $x \rightarrow 0$ b) $x \rightarrow \frac{-1^+}{4}$ c) $x \rightarrow \infty$ d) $x \rightarrow \frac{-1^+}{8}$

L9.- Completar

a) $2 \log(2) \underline{\hspace{1cm}} 3 \log(2)$
<,>,<=,=>

b) $2 \log_{1/2}(5) \underline{\hspace{1cm}} 3 \log_{1/2}(5)$
<,>,<=,=>

c) $\log(2) \underline{\hspace{1cm}} \log(3)$
<,>,<=,=>

d) $\log_{1/2}(5) \underline{\hspace{1cm}} 3 \log_{1/2}(7)$
<,>,<=,=>

L10.- Determinar el dominio, el rango y la regla de correspondencia de la **función recíproca** y de la **función inversa** de las funciones que aparecen a continuación.

a) $y = e^x$ b) $y = \left[\frac{1}{2}\right]^x$ c) $y = 2(3^x)$
d) $y = \log x$ e) $y = -\log_3 x$ f) $y = \log_{1/2}(x+3)$

L11.- En cada inciso determinar el dominio de la función

a) $y = \ln(3-x)$ b) $y = \sqrt{\ln x}$ c) $y = \ln(x^2-1)$
d) c) $y = \ln|x|$ e) $f(x) = \ln\sqrt{t^2-1}$ f) $g(x) = \frac{1}{\ln x}$
g) $f(x) = \ln(e^x + 1)$ h) $y = \frac{\ln(3x+7)}{x-8}$ i) $y = \ln\left(\frac{3x-1}{1-x}\right)$
j) $g(x) = \ln(\ln(x))$ k) $g(x) = \frac{1}{\ln(\ln(x))}$ l) $y = 10^{\ln(x+5)}$

Algunas propiedades de los logaritmos son:

1. $a^{\log_a x} = x$, para $x > 0$; 2. $\log_a a^x = x$, para toda x en R .

L12.- ¿Por qué hay restricciones diferentes para x en las propiedades arriba mencionadas?

L13.- En cada inciso simplificar indicando el dominio.

a) $e^{\ln(2x)}$ b) $\ln(e^{\ln x})$ c) $10^{\log(x+5)}$ d) $\log_2(4^w)$

Tarea del Swokowski Sec.5.4 problemas 15 a 20, 37 a 54, Sec.5.5 problemas 39 a 54.

Propiedades

Si $a > 0$, $a \neq 1$, $y = \log_a x$. Sean $x > 0$, $y > 0$, $x, y \in R$

1.- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ 2.- $\log_a(x^y) = y \log_a(x)$
3.- $\log_a\left(\frac{1}{y}\right) = -\log_a(y)$ 4.- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
5.- $\log_a a = 1$ 6.- $\log_a(1) = 0$

L14.- Expresar en términos de $\ln(5)$ y $\ln(7)$,

a) $\ln\left(\frac{1}{125}\right)$ b) $\ln(9.8)$ c) $\ln(7\sqrt{7})$ d) $\ln(0.056)$

L15.- Encontrar las expresiones más sencillas para las cantidades en cada inciso.

a) $e^{-\ln 0.5}$ b) $e^{3\ln x - \ln 7}$ c) $\exp(\ln(x^2) - 2 \ln y)$.
d) $\ln(e)$ e) $\log(1)$ f) $\log_2(4^3)$

L16.- Expresar y en términos del logaritmo de la variable correspondiente.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } y = \ln(5x) & \text{b) } y = \ln(t^{5/3}) & \text{c) } y = (\log(x))^4 \\ \text{d) } y = \log\left(\frac{t \sin t}{t+1}\right) & \text{e) } y = \ln\left(\frac{(3x-7)(x+5)^{15}}{x^3(\sqrt{x+3})}\right) & \text{f) } y = t\sqrt{\ln(t+2y)} \\ \text{g) } y = \ln(3\theta^2 e^{-\theta}) & \text{h) } y = \ln\left(\frac{et \sin t}{e'(t+1)}\right) & \text{i) } y = \ln\left(\frac{3x-1}{1-x}\right) \end{array}$$

L17.- Expresar como un solo logaritmo.

$$\text{a) } \ln(\sec \theta) + \ln(\cos \theta) \quad \text{b) } \ln(8x + 4) - 2\ln(2) \quad \text{c) } 3\ln\sqrt[3]{t^2 - 1} - \ln(t+1)$$

L18.- (TAREA) Encontrar las expresiones más sencillas para las cantidades en cada inciso.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } e^{\ln(x^2+y^2)} & \text{b) } \ln(e^{5\ln x}) & \text{c) } \log(10) \\ \text{d) } \ln(e^\theta) - e^{\ln \theta} & \text{e) } \ln(e^{e^x}) & \text{f) } \ln(1) \\ \text{g) } 2^{\log_2 3} & \text{h) } \pi^{\log_x 7} & \text{i) } \log_{11} 121 \\ \text{j) } \log_{121} 11 & \text{k) } \log_3 \frac{1}{9} & \text{l) } \log((1000)^{-2}) \\ \text{m) } 5^{\log_5(3x^2)} & \text{n) } \log_e(e^x) & \text{o) } \log_4(4^{e^x \sin x}) \end{array}$$

L19.- Cambiar a forma logarítmica.

$$\text{a) } 3^2 = 9 \quad \text{b) } 2^{-3} = 1/8 \quad \text{c) } 5^{2x} = y - z \quad \text{d) } e^\theta = 3m + 1$$

L20.- Cambiar a forma exponencial.

$$\text{a) } \log_3(9) = 2 \quad \text{b) } \log(0.1) = -1 \quad \text{c) } \log_b(35) = x + 2 \quad \text{d) } \log w = q$$

Tarea del Swokowski Sec.5.4 problemas 1 a 4, 11 a 14, Sec.5.5 problemas 1 a 16.

L21.- En cada inciso resolver la ecuación (cuidado con el dominio).

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \log(x-3) = \log(7-2x) & \text{b) } 8^{\log_8 3} - e^{\ln 5} = x^2 - 7^{\log_7(3x)} \\ \text{c) } \log_2(x-3) = 1 & \text{d) } \ln(\sqrt{x} - 5) = 0 \\ \text{e) } \ln(e^\theta) - e^{\ln \theta} = 0 & \text{f) } \frac{x^2 \ln(x+3)}{x^2 + 1} = 0 \\ \text{g) } \log(\sqrt{x}) = -1 & \text{h) } \log_3(x) = -3 \\ \text{i) } \log_5(5^{x-3}) = 2 & \text{j) } \log_x(e^2) = 2 \\ \text{k) } \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2^{-t^2} = \frac{1}{8} & \text{l) } \ln(x^2) = 16 \\ \text{m) } x - 1 = \log_7(\sqrt[5]{7^3}) & \text{n) } \log_3(x^3 + 5) = -4 \end{array}$$

- o) $\log_2(x^2 + 4) = 2\log_2(x - 2)$ p) $e^{2x-5} = 2$
 q) $\log_2(x + 4) = \log_2(x - 2) + 3$ r) $7^{x-3} = 5^{2x+1}$
 s) $\log_2(x^2 - 4) = \log_2(x - 2) + 3$ t) $\log_5(7^{x-3}) = 2$

L22.- (TAREA) Resolver las ecuaciones indicadas a continuación (**cuidado con el dominio**):

- a) $\log(x) = 1 - \log(x - 3)$ b) $\log_2(x^2 - 10x + 18) = 1$
 c) $\log_4(-x) + \log_4(6 - x) = 2$ d) $2^{-x^2} = 5$
 e) $5(7^x) = 6(8^x)$ f) $0.182^x = 0.93$
 g) $\log(x^2 + 4) - \log(x + 2) = 3 + \log(x - 2)$ h) $4^x - 4^{x-1} = 3^{x+1} - 3^x$
 i) $Ae^{yt} = Be^{st}$ donde $A > 0$, $B > 0$ y $y \neq s$

L23.- Resolver las desigualdades que aparecen en cada inciso. (**Cuidado con el dominio**)

- a) $\log(x - 3) > \log(7 - 2x)$ b) $\log_2(x - 3) \geq 1$ c) $\log_2[x(x - 3)] \leq 0$
 d) $\ln(x) < 0$ e) $\ln(x) > 0$ f) $\frac{x^2 \ln(x + 3)}{x^2 + 1} \leq 0$
 g) $\log(x) > 2$; h) $\log_3(x) \geq 1$ i) $\log_2(x) \leq -1$
 j) $\log_{1/3}(x) > 2$ k) $\log_{1/2}(x) \leq -1$ l) $\log_{1/e}(x^2 - x - 1) \geq 0$

L24.- En cada inciso despejar la variable que se indica.

- a) y , $\ln(1 - 2y) = t$ b) y , $e^{ky} = 1/10$
 c) t , $P = B + Ae^{rt}$ d) t , $P = B + 2^{rt-d}$
 e) t , $Ae^{yt} = Be^{st}$ donde $A > 0$, $B > 0$ y $y \neq s$.
 f) y , $\ln(y^2 - 1) - \ln(y + 1) = \ln(\sin(x))$.

Tarea del Swokowski Sec.5.4 problemas 5 a 10, 21 a 35, Sec.5.5 problemas 17 a 38.

L25.- Leer con cuidado la demostración de la fórmula para calcular $\log_a x$.

$$a^{\log_a x} = x \Rightarrow \ln a^{\log_a x} = \ln x \Rightarrow (\log_a x)(\ln a) = \ln x \Rightarrow \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

L26.- Plantear como un cociente de logaritmos naturales o de logaritmos comunes y usar la calculadora para determinar:

- a) $\log_5 8$ b) $\log_7 0.15$ c) $\log_{0.5} 9$ d) $\log_2 24$ e) $\log_{12} 3$

L27.- Expresar como cocientes de logaritmo natural y simplificar:

a) $\frac{\log_{16} x}{\log_4 x}$

b) $\frac{\log_{\sqrt{10}} x}{\log_{\sqrt{2}} x}$

c) $\frac{\log_a b}{\log_b a}$

Factores de conversión Sean $a > 0$ y $a \neq 1$, $b > 0$ y $b \neq 1$ la ecuación para convertir

logaritmos base a a logaritmos base b es $\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$.

L28.- Leer con cuidado la demostración de $\log_b x = \frac{\ln a}{\ln b} \log_a x$.

Demostración Como $a > 0$ y $a \neq 1$ entonces $\frac{\ln a}{\ln b} \log_a x = \frac{\ln a}{\ln b} \frac{\ln x}{\ln a} = \log_b x$

L29.- Resolver (**Cuidado con el dominio**)

a) $\log_4(x) - \log_8(x) = 1$

b) $\log(\log(x)) = 2$

c) $\log(x^3) = (\log(x))^3$

d) $\log(\sqrt{x^3 - 9}) = 2$

e) $\log(\sqrt{x}) = \sqrt{\log(x)}$

f) $e^x + 4e^{-x} = 5$

L30.- Despejar x en cada inciso.

a) $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

b) $y = \frac{10^x + 10^{-x}}{10^x - 10^{-x}}$

c) $A_x = A_0 \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kx}$

L31.- ¿Para qué valores de x la ecuación $e^{\ln(2x-3)} = 2x - 3$ es verdadera?

Tarea del Swokowski Sec.5.6 problemas 1 a 45. Ejercicios de repaso 7 a 52, 55,56